













NOMBRE GENÉRICO / NOMBRE COMERCIAL	INDICACIONES	
 <p>ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO MEPENTOL®</p>	<p>Prevención. Tratamiento Estadio I. No aplicar en prematuros extremos (< 28 SG) los primeros 15 días de vida</p>	
 <p>APÓSITO COLÁGENO PROMOGRAM®</p>	<p>Lesiones en fase de granulación.</p>	
 <p>APÓSITO HIDROCOLOIDE LACERON®</p>	<p>Prevención. Tratamiento Estadio I y II. Protección de zonas de fricción. Zonas expuestas a contaminantes como heces y orina. No utilizar en pieles muy sensibles.</p>	Máx: 7 días
 <p>APÓSITO ALGINATO BIATAIN® BIATAIN Ag®</p>	<p>Exsudado (moderado,abundante). Sagrado. Facilita desbridamiento autolítico. Infecciones exsudativas (con plata). Realizar seguimiento analítico de niveles de plata, calcio y sodio en sangre Con prescripción médica</p>	Máx: 1-4 días
 <p>APÓSITO DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro) Cutimed® Sorbact®</p>	<p>Herida contaminada, colonizada e infectada Exsudado (moderado,abundante). No utilizar en prematuros</p>	
 <p>POMADA ENCIMÁTICA COLAGENASA IRUXOL MONO®</p>	<p>Desbridamiento encimático. No utilizar en prematurs, recién nacidos. En niños grandes con prescripción medica</p>	
 <p>ESPUMA POLIMÉRICA MEPILEX® MEPILEX lite® ALLEVYN®</p>	<p>Prevención sobre prominencias óseas o zonas sometidas a presión y/o fricción. Lesiones superficiaels profundas con exsudado moderado o abundante. Como apósito primario,secundario.</p>	Máx: 7 días
 <p>HIDROGEL PURILON®</p>	<p>Lesiones poco exudativas. Desbridamiento autolítico. Favorece la granulación. Máx: según al producto al que se asocie. 3-4 días amb espuma polimérica</p>	
 <p>ÓXIDO DE ZINC AMNIO PLUS®</p>	<p>Protección de la piel periluceral. Retirar con aceite de parafina.</p>	Máx: c/12h
 <p>PELÍCULAS BARRERA crema i spray CAVILON®</p>	<p>Prevención y tratamiento de la dermatitis por incontinencia. Prevención de la maceración e irritación de la piel periluceral. Protección de la piel periluceral de cualquier de herida, tubo de drainage,etc No utilizar en prematuros En spray se pueden utilizar en niños a partir de un mes</p>	Hasta 72 horas
 <p>SOLUCIÓ DE POLIHEXANIDA I UNDECILENAMIDOPEOPILBETAINA ILIZARA PRONTOSAN®</p>	<p>Limpieza de las lesiones con signos de colonización o infección, tejido necrosado o esfácelado.</p>	

Los apósitos deberían mantenerse en la herida tanto tiempo como esté clínicamente justificado y sea concordante con las recomendaciones del producto.
Los cambios frecuentes e injustificados no sólo no permiten una buena evolución, sino que pueden empeorar la úlcera.